

患者向医薬品ガイド  
2011年8月作成

## エディロールカプセル 0.5 μg エディロールカプセル 0.75 μg

### 【この薬は？】

販売名	エディロールカプセル 0.5 μg EDIROL Capsule 0.5 μg	エディロールカプセル 0.75 μg EDIROL Capsule 0.75 μg
一般名	エルデカルシトール Eldecalcitol	
含有量 (1カプセル中)	0.5 μg	0.75 μg

### 患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知りたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、「医薬品医療機器情報提供ホームページ」  
<http://www.info.pmda.go.jp/> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、骨粗しょう症治療剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、小腸でのカルシウム吸収を助け、骨密度を増やし骨を強くして、骨粗しょう症による骨折を予防します。
- ・次の病気の人に処方されます。

#### 骨粗鬆症

- ・この薬は、体調がよくなつたと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

### 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・妊婦または妊娠している可能性がある人、授乳中の

次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・腎臓に障害のある人、悪性腫瘍のある人、原発性副甲状腺機能亢進症の人など高カルシウム血症になるおそれのある人
- ・肝臓に重度の障害がある人
- ・尿路結石のある人および過去に尿路結石があった人

この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

妊娠する可能性のある人は、この薬の使用前に問診と妊娠検査が行われます。

## 【この薬の使い方は？】

### 使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

販売名	エディロールカプセル 0.5 μg	エディロールカプセル 0.75 μg
1回量		1カプセル
飲む回数		1日1回

### どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

### 飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。飲み忘れに気づいた場合には1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

### 多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬には催奇形性（胎児に奇形が生じる可能性）の報告があるので、妊娠する可能性がある人はこの治療の必要性や胎児への影響について十分理解できるまで説明を受け、この薬を使用している間は避妊してください。また、この薬を使用している間に妊娠がわかった場合には、すぐに主治医に相談してください。
- ・この薬の使用中は定期的（3～6ヶ月に1回程度）に血清カルシウム値の検査が行われます。高カルシウム血症になるおそれのある人は、使い始めの時期に検査の回数が増えることがあります。
- ・尿路結石のある人および過去に尿路結石があった人は、この薬の使用中は定期的に尿中カルシウム値の検査が行われます。
- ・からだがだるい、いらいらする、吐き気、口が渴くなどの症状があらわれた場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
高カルシウム血症 こうカルシウムけつしょう	口の渴き、水を多く飲む、吐き気、嘔吐、尿量が多い、注意力が散漫になる
急性腎不全 きゅうせいじんふぜん	からだがだるい、からだのむくみ、疲れやすい、意識の低下、頭痛、眼がはれぼったい、息苦しい、尿量が減る
尿路結石 にょうろくせき	激しい腰や背中の痛み、腹痛、血尿

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。  
これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	からだがだるい、からだのむくみ、疲れやすい
頭部	意識の低下、頭痛
眼	眼がはれぼったい
口や喉	口の渴き、水を多く飲む、吐き気、嘔吐
胸部	吐き気、息苦しい
腹部	吐き気、腹痛
背中	激しい腰や背中の痛み
尿	尿量が多い、尿量が減る、血尿
その他	注意力が散漫になる

## 【この薬の形は？】

販売名	エディロールカプセル 0.5 μg	エディロールカプセル 0.75 μg
PTP シート		
形状	軟カプセル	軟カプセル
直径	6.6mm	
重さ	164mg	
色	茶白色不透明	茶褐色透明
識別コード	本体：なし PTP:エディロール 0.5 μg	本体：なし PTP:エディロール 0.75 μg

## 【この薬に含まれているのは？】

販売名	エディロールカプセル 0.5 μg	エディロールカプセル 0.75 μg
有効成分	エルデカルシトール	エルデカルシトール
添加物	内容物：トコフェロール、中鎖 脂肪酸トリグリセリド カプセル：ゼラチン、D-ソル ビトール、カラメル、 酸化チタン	内容物：トコフェロール、中鎖 脂肪酸トリグリセリド カプセル：ゼラチン、D-ソル ビトール、カラメル

## 【その他】

### この薬の保管方法は？

- ・光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### 薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。

・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：中外製薬株式会社 (<http://www.chugai-pharm.co.jp>)

発売会社：大正富山医薬品株式会社 (<http://www.taishotoyama.co.jp>)

お客様相談室

電話：0120-591-818 03-3985-5599

受付時間：8時30分～17時（土・日・祝日を除く）